

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pada penggunaan artemisin didapatkan penurunan batas atas, mengeluhkan adanya gangguan pendengaran subjektif dan mengeluhkan adanya gangguan keseimbangan (vertigo). Artemisin dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan namun tidak sebanyak pada pasien yang menggunakan klorokuin.
2. Pada penggunaan klorokuin didapatkan mengalami penurunan batas atas, mengeluhkan adanya gangguan pendengaran dan keseimbangan secara subjektif. Klorokuin yang paling banyak menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan.
3. Pada penggunaan obat kombinasi didapatkan mengalami penurunan batas atas, mengeluhkan adanya gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan secara subjektif. Kombinasi juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan keseimbangan namun dalam jumlah yang paling sedikit.

5.2.Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Penggunaan obat untuk terapi malaria sebaiknya adalah kombinasi karna dapat meningkatkan efek terapi, menurunkan efek samping dan dosis yang lebih kecil.
2. Pada penggunaan obat antimalaria sebaiknya lakukan tes pendengaran untuk melihat kemungkinan efek samping yang dapat terjadi pada pasien berupa gangguan pendengaran.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tes pendengaran kualitatif, sebaiknya digunakan tes pendengaran kuantitatif seperti audiometri.