

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Angka kejadian pneumonia pada bayi dan anak = 0,32
- 2) Prosentase penderita anak = **53,49%** dan prosentase penderita bayi = **46,51%** maka diperoleh ratio penderita anak : bayi = 1,15 : 1. Ratio yang didapatkan dari hasil penelitian tidaklah sesuai dengan teori yang ada karena herdasarkan teori pneumonia lebih banyak menyerang bayi sedangkan **dari** hasil penelitian menunjukkan pneumonia lebih banyak menyerang anak-anak. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya warga yang memeriksakan bayi mereka **ke** dokter swasta daripada ke puskesmas.

5.2. Saran

1. **Bagi** puskesmas diharapkan untuk lebih sering memberikan penyuluhan pada warga sekitar khususnya para ibu yang mempunyai bayi dan anak inengenai bahayanya pneumonia dan bagaimana pencegahannya.
2. Penyuluhan **bagi** para ibu untuk meningkatkan status gizi bayi dan anak untuk meningkatkan ketahanan tubuh bayi dan anak.
3. Pemberian vaksinasi Hib pada anak kurang dari 2 tahun dan pemberian Pneumococ **vaksin** pada anak lebih dari 2 tahun pada bayi dan anak **pada** keluarga yang mampu hal ini disebabkan karena hedua **vaksin** ini mahal harganya.