

ABSTRAK

Di negara-negara berkembang, diare merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian pada anak. Penyebab utama kematian diare adalah dehidrasi.

Penulisan karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pada kelompok umur berapa bulan dan pada bulan apa, anak batita paling tinggi prevalensi diarenya.

Penelitian dilakukan secara retrospektif eksperimental semu, dengan cara mencatat rekaman medik anak batita yang terserang diare periode 1 Januari–30 Juni 2000, di RS Immanuel.

Hasil yang didapat dari penelitian dari 399 penderita diare berusia di bawah tiga tahun yang dirawat di RS Immanuel periode 1 Januari-30 Juni 2000 adalah jumlah ini merupakan **3,4%** dari seluruh penderita yang dirawat di RS Immanuel, dan merupakan **22,4%** dari seluruh penderita yang dirawat di Bagian Anak RS Immanuel; kelompok **umur 6-9** bulan merupakan kelompok **umur** penderita yang paling banyak dirawat (24,3%); dan bulan perawatan paling banyak adalah April (27,3%).

Kesimpulan **dari** penelitian adalah prevalensi diare paling tinggi yaitu bulan April, pada kelompok umur 6-9 bulan.

Saran, dilakukan pengisian status penderita diare di RS Immanuel lebih lengkap, dan dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lengkap lagi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan prevalensi diare.

ABSTRACT

In developing countries, diarrhoea is a main cause of children's illness and death. The main cause of death diarrhoea caused by dehydration.

The objective of this paper is to identify on what age group and on what month, the child below the age of three is highest in diarrhoea prevalence.

The research is carried out in pseudo experimental **retrospective** by recording children below the age of three medically who were attacked by diarrhoea between the 1st of January – 30th of June 2000 in RS Immanuel.

The result obtained from the research of 399 patients of diarrhoea under three years old who have been treated in RS Immanuel between the 1st of January – 30th of June 2000 is this number represents 3,4% of the entire patients treated in RS Immanuel and 22,4% of the entire patients treated in the Pediatric Department of RS Immanuel; the age group of 6-9 months is the age group of the patients who are mostly treated (24,3%); and it is on the month of April (27,3%).

The **conclusion** of this research is the highest diarrhoea prevalence is in April, in the age group of 5-9 months.

The suggestion, the status filling of the diarrhoea patients in RS Immanuel should be conducted thoroughly and the research of the factors that can influence the increase of diarrhoea prevalence should be conducted in detail.

DAFTAR ISI

	halaman
Judul	1
Persetujuan Pembimbing	ii
Pernyataan Mahasiswa	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Prakata	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Lampiran	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Kerangka Pemikiran	3
1.6 Hipotesa	5
1.7 Metodologi	6
1.8 Lokasi dan Waktu	6
Bab II Tinjauan Pustaka	7
2.1 Angka Kesakitan dan Kematian	7
2.2 Etiologi	7
2.3 Epidemiologi	8
2.4 Patogenesis	9
2.5 Patofisiologi	10
2.6 Klinik	11
2.7 Komplikasi	14
2.8 Hubungan Dengan Penyakit Lain	17
2.9 Pengobatan	19

2.10 Pencegahan	19
2.11 Prognosis	20
Bab III Metode Penelitian	21
3.1 Subjek Penelitian	21
3.2 Metode Penelitian	21
Bab IV Hasil dan Pembahasan	22
4.1 Jumlah Kejadian dan Perawatan	22
4.2 Umur	23
4.3 Bulan Saat Penderita Dirawat	23
Bab V Kesimpulan dan Saran	25
5.1 Kesimpulan	25
5.2 Saran	25
Daftar Pustaka	26
Lampiran	27
Riwayat Hidup	29

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Jumlah dan Bulan Perawatan	27
Lampiran 2 Distribusi Umur	28