

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Gambaran profil lipid dari 108 pasien Diabetes melitus tipe 2 yang dirawat di RS Immanuel Bandung periode Januari-Desember 2005, 34,26 % diantaranya menderita Hiperlipidemia dan sisanya (65,74 %) tidak menderita Hiperlipidemia.
2. Insidensi hiperlipidemia pada pasien DM tipe 2 yang dirawat di RS Immanuel periode Januari-Desember 2005 paling banyak diderita oleh pasien perempuan (54,05 %) dibandingkan pasien laki-laki (45,95 %).
3. Prevalensi tipe hiperlipidemia yang sering terjadi pada pasien DM tipe 2 yang dirawat di RS Immanuel periode Januari-Desember 2005 adalah rendahnya kadar HDL (81,08 %), tingginya kadar LDL (70,30 %) sedangkan hipertrigliseridemia 59,50 %.
4. Perbedaan tipe hiperlipidemia yang diderita pasien DM tipe 2 yang dirawat di RS Immanuel Bandung periode Januari-Desember 2005 dengan tipe hiperlipidemia yang diderita pasien DM tipe 2 di daerah lain mungkin disebabkan oleh perbedaan pola diet, gaya hidup dan penyakit lain.

SARAN

Penelitian ini masih jauh dari sempurna sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan seperti :

1. pencarian data yang lebih banyak dengan melihat pasien-pasien DM tipe 2 yang dirawat jalan dan dirawat inap di rumah sakit lain.
2. data rekam medik yang lengkap.