

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

- 1 Prevalensi PJK pada penderita DM di RS Immanuel periode Oktober 2000 – Mei 2001 sebanyak **28** (26,3%) dari 106 kasus DM Usia paling sering antara 60-69 tahun Terdapat peningkatan kejadian PJK pada penderita wanita DM setelah menopause
- 2 Prevalensi penderita infark miokard dari penderita DM yang mempunyai komplikasi PJK adalah 9 (32,4%), 5 orang wanita (**18%**) dan 4 orang laki-laki (14,4%)
- 3 Prevalensi silent infark cukup tinggi, yaitu 55,6% dari seluruh penderita infark miokard

5.2 Saran

- Perlu diteliti lebih lanjut prevalensi PJK pada penderita DM pada berbagai pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit di Indonesia untuk gambaran yang lebih menyeluruh dan rinci.
- Penderita wanita DM setelah menopause perlu berhati-hati terhadap resiko PJK.
- Mengingat angka kejadian silent infark pada penderita DM cukup tinggi, maka perlu dilakukan pemeriksaan EKG yang teratur dan kontrol ketat penyakit DM, sehingga dapat dicegah dan diketahui lebih dini.
- Perlu dilakukan penelitian secara prospektif lebih lagi, agar perolehan data lebih akurat