

ABSTRAK

Carcinoma cervix uteri merupakan salah satu jenis kanker yang masih banyak terdapat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kanker ini, dapat semakin meningkatkan insidensi carcinoma cervix uteri. Oleh sebab itu, sangat diharapkan pengetahuan yang cukup untuk dapat menurunkan insidensi carcinoma ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui insidensi carcinoma cervix uteri yang tercatat di Rumah Sakit Immanuel Bandung, pada tahun 2000.

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat studi retrospektif. Data-data diambil dari catatan medik bagian Obstetri dan Ginekologi yang kemudian dikonfirmasi lagi ke bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Immanuel Bandung, untuk mengetahui jenis histopatologik carcinoma cervix uteri.

Dari penelitian yang dilakukan, didapat jumlah kasus carcinoma cervix uteri yang tercatat di Rumah Sakit Immanuel Bandung sebanyak 59 kasus, dengan jumlah kasus terbanyak didapat pada usia 36 – 40 tahun yaitu sebanyak 20,3% kasus. Stadium klinik yang terbanyak didapat adalah stadium **IIA** dan **IIB**, sebanyak **18,6%** dan **16,9% kasus**. Carcinoma cervix uteri tidak didapatkan pada wanita yang belum pernah kawin. Dan jenis carcinoma cervix uteri yang paling sering adalah epidermoid carcinoma cervix, sebanyak **50,8%** kasus. Data lain yang tercatat seperti paritas menjadi kurang bermanfaat karena pada lebih dari 50% total kasus data tersebut tidak tercantum di dalam catatan medik yang bersangkutan.

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa insidens tertinggi carcinoma cervix uteri adalah pada usia 36 – 40 tahun, dengan stadium klinik yang paling sering yaitu stadium **IIA** dan **IIB** Carcinoma ini tidak ditemukan pada wanita yang belum pernah kawin, sedangkan jenis yang paling sering adalah epidermoid carcinoma cervix.

ABSTRACT

Cancer of the uterine cervix (carcinoma cervix uteri) is one of the most frequent cancers in developing countries, including Indonesia. Low educational level about this type of cancer by the public may be one of the reasons of its incidence.

The purpose of this study is to find out the actual incidence of the cancer of the uterine cervix recorded in Immanuel Hospital in Bandung, in the year 2000.

This study is a retrospective study based on data taken from medical records available in the Obstetrics and Gynecology Department and relevant pathology reports in Pathology Department of the Immanuel Hospital for the year 2000.

During this period of study a total number of 59 cases of uterine cervical cancer were recorded. Most of these cases were of the 36-40 years age group (20.3%) and at the stage IIA and IIB clinical stages (18.6% and 16.9% respectively). This study also reveals that cancer of the uterine cervix was not found among unmarried women and that the most frequent type of the cancer was of the epidermoid type (50.8%). Other important data, such as purity and age at marriage could not be revealed because of the insufficient information available in the medical record.

DAFTAR ISI

JUDUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Identifikasi Masalah	2
1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian	3
1.4.Kegunaan Penelitian	3
1.5.Kerangka Pemikiran	3
1.6.Metodologi Penelitian	4
1.7.Lokasi dan Waktu Penelitian	5
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
 BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	13
 BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	19
5.2. Saran	19
 DAFTAR PUSTAKA	21

LAMPIRAN GAMBARAN MAKROSKOPIS	
CARCINOMA CERVIX UTERI	23
LAMPIRAN GAMBARAN KOLPOKOPI	
CARCINOMA CERVIX UTERI	24
LAMPIRAN GAMBARAN MIKROSKOPIS	
CARCINOMA CERVIX UTERI	25
LAMPIRAN GAMBARAN SITOLOGI	
CARCINOMA CERVIX UTERI – PENGECATAN PAP SMEAR	26
RIWAYAT HIDUP	27