

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- Kadar SGOT penderita infeksi Dengue meningkat.
- Kadar SGPT penderita infeksi Dengue meningkat.
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGPT yang meningkat (89%) lebih banyak daripada yang dengan peningkatan kadar SGOT (85%).
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGOT yang meningkat pada DD 72%, DHF 92%, dan DSS 100%.
- Jumlah penderita infeksi Dengue dengan kadar SGPT yang meningkat pada DD 89%, DHF 87%, dan DSS 100%.

5.2 Saran

- Penderita infeksi Dengue sebaiknya diperiksa kadar SGOT dan SGPT dapat mengetahui beratnya gangguan fungsi hati.
- Untuk mengetahui hubungan antara derajat penyakit infeksi Dengue dengan peningkatan kadar SGOT dan SGPT sebaiknya dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar (minimal 30 sampel untuk masing-masing derajat infeksi).
- Penatalaksanaan penderita infeksi Dengue dengan gangguan fungsi hepar perlu mendapatkan perhatian para klinisi agar menurunkan angka morbiditas dan mortalitas penderita infeksi Dengue.