

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Penderita terbanyak yaitu perempuan, golongan umur 15-45 tahun, bekerja sebagai buruh tani, dan bertempat tinggal di Desa Tangkit.
2. Gejala klinik yang sering digunakan untuk mendiagnosis kasus pada Chikungunya komunitas adalah demam, nyeri sendi dan adanya ruam.

5.2. Saran

1. Dinas Kesehatan setempat mengadakan survei epidemiologi bila terdapat kejadian Chikungunya. Kegiatan survei epidemiologi yang dapat dilakukan adalah memastikan adanya suatu KLB (dibandingkan dengan periode sebelumnya), informasi vektor, lingkungan, perilaku penduduk dan pengumpulan data epidemiologi (primer & sekunder)
2. Perlu diadakannya penyuluhan tentang kebersihan lingkungan, yang ditujukan untuk memberantas sarang nyamuk dan jentik nyamuk.
3. Dalam mendiagnosis Chikungunya diperlukan pemeriksaan laboratorium sebagai penunjang dan diagnosis pasti. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium sederhana, seperti Hitung Jenis dan pemeriksaan Trombosit, untuk menyingkirkan diagnosis banding Chikungunya, yaitu Demam Berdarah Dengue (DBD).