

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa:

- Prevalensi ASD di Rumah Sakit Hasan Sadikin pada periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2009 adalah 56 kasus.
- ASD terjadi pada 10 % kasus kelainan jantung kongenital dari Rumah Sakit Hasan Sadikin pada periode 1 Januari 2007- 31 Desember 2009.
- ASD ditemukan pada 31% pria dan 69% wanita.
- Gejala awal ASD terdapat pada hampir semua golongan umur, golongan umur yang tidak menunjukkan gejala awal ASD adalah pada lansia, sedangkan terbanyak adalah pada bayi dengan 12 kasus (30 %).
- ASD yang terisolasi terdapat pada 59 % kasus, bersamaan dengan kelainan jantung kongenital lainnya 28% kasus dan bersamaan dengan sindroma akibat kelainan kromosomal pada 13% kasus.
- Gejala klinik awal pada ASD terisolasi muncul pada neonatus sampai dewasa, dengan golongan umur terbanyak adalah dewasa muda dengan usia 21 - <31 tahun dengan 6 kasus (26%).
- Berdasarkan tipe ASD, terdapat 90% ASD ostium sekundum, sedangkan ASD ostium primum dan defek sinus venosus masing-masing terdapat pada 5% kasus

5.2 Saran

- Untuk Bagian Rekam Medis Rumah Sakit Hasan Sadikin agar data pasien dibuat lebih lengkap dan tepat sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi tenaga medis dan paramedik.
- Meningkatkan kewaspadaan dokter terhadap gejala dini ASD.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ASD melalui penyuluhan dan penerangan sehingga dapat mengetahui gejala dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat.