

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Dari data penderita pasien Karsinoma Prostat yang tercatat di rekam medik pada bagian Rekam Medik Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 2007-2009, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Distribusi karsinoma prostat berdasarkan usia adalah sebagai berikut presentase pasien terbanyak pada rentang usia 66 sampai 70 tahun sebanyak 6 orang (25%), di ikuti rentang usia 61-65 tahun dan usia 71-75 tahun masing - masing 5 orang penderita (20,8%), rentang usia 56 sampai 60 tahun sebanyak 3 orang (12,5%), dan presentase terendah pada rentang usia 86 sampai 90 tahun hanya 1 orang (4,1%)
- Distribusi karsinoma prostat berdasarkan kadar PSA adalah sebagai berikut Sebanyak 19 penderita memiliki kadar PSA lebih dari 12 ng/ml.
- Distribusi karsinoma prostat berdasarkan diagnosis awalnya adalah sebagai berikut hanya 8 pasien yang didiagnosis awal sebagai karsinoma prostat, sedangkan lebih dari setengah pasien didiagnosis awal sebagai BPH 14 pasien.
- Distribusi karsinoma prostat berdasarkan gambaran histopatologinya adalah sebagai berikut *Gleason grade* yang sering dijumpai pada penelitian ini adalah yang *poorly differentiated/undifferentiated (Gleason score 7-10)* sebanyak 3 penderita. Untuk yang *well differentiated (Gleason score 2-4)* hanya 1 penderita sedangkan *moderately differentiated (Gleason score 5-6)* sebanyak 2 penderita.

## 5.2.Saran

- Deteksi dini terjadinya keganasan pada prostat sebaiknya dilakukan mulai umur 50 tahun, terutama pada kelompok umur 65-69 tahun.
- Deteksi dini keganasan pada prostat harus dilakukan secara lengkap agar karsinoma prostat dapat terdeteksi secara dini.
- Data pasien dibuat lebih lengkap dan tepat sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi tenaga medis dan paramedik.