

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. SIMPULAN

Pada penelitian ini disimpulkan bahwa prevalensi ulkus pada pengguna alat ortodontik cekat di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Kristen Maranatha adalah 55 orang (80,88%) dan yang paling banyak mengalami adalah perempuan sebanyak 40 orang (81,63%). Ulkus muncul pertama kali pada periode < 1 bulan setelah penggunaan alat dengan persentase 61,82%, penyebab ulkus yang paling sering terjadi akibat alat ortodontik cekat dengan persentase 89,10%, lokasi yang paling sering terjadi ulkus di mukosa bukal dengan persentase 58,18%. Waktu munculnya ulkus paling sering pada awal pemakaian dengan persentase 40,58%, frekuensi terjadinya ulkus paling banyak tidak teratur dengan persentase 85,46% dan frekuensi munculnya ulkus berkaitan dengan menstruasi pada wanita tidak teratur dengan persentase 87,5%.

#### 5.2. SARAN

- 1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai komponen alat apa saja yang dapat menyebabkan ulkus traumatik.
- 2) Perlu ditanyakan kepada pasien pengguna alat ortodontik mengenai bagaimana keadaan *oral hygiene* pasien.

- 3) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana atau cara apa yang pasien lakukan untuk mengobati ulkus traumatik yang dialami.

