

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 31 data penderita karsinoma prostat yang diambil dari rekam medis di Rumah Sakit Immanuel periode 1 Januari 2003 – 31 Mei 2010 dan diperoleh hasil bahwa angka kejadian karsinoma prostat tersering adalah pada usia 66-75 tahun. 32% penderita karsinoma prostat menunjukkan gejala klinik awal berupa retensi urin. 88% yang melakukan pemeriksaan kadar PSA mempunyai kadar > 12 ng/ml. Penderita karsinoma prostat yang didiagnosis awal sebagai BPH terdapat sebanyak 61,3%. Grading histopatologis dilakukan pada 6 dari 10 penderita yang melakukan pemeriksaan.

5.2. Saran

- Data pasien dibuat lebih lengkap dan tepat sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi tenaga medis dan paramedik.
- Meningkatkan kewaspadaan dokter terhadap gejala dini karsinoma prostat.
- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang karsinoma prostat melalui penyuluhan dan penerangan sehingga dapat mengetahui gejala dini serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berobat.