

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari data rekam medis persalinan pervaginam dan SC dengan skor APGAR di RSUD Kota Bogor pada tahun 2016, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

- 1) Angka kejadian asfiksia neonatorum pada jenis persalinan SC lebih besar dibandingkan pada jenis persalinan pervaginam dengan data 53 kasus asfiksia, 38 kasus dikarenakan persalinan melalui SC. 15 kasus disebabkan oleh persalinan pervaginam.
- 2) Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkatan asfiksia neonatorum dengan jenis persalinan pervaginam dan persalinan SC.

5.2 Saran

Dari hasil yang didapatkan penelitian yang sudah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi skor APGAR.
- 2) Diharapkan adanya penelitian ini dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan data rekam medik yang lebih lengkap di rumah sakit yang lain.
- 3) Diharapkan para petugas kesehatan yang akan menolong persalinan selalu siaga untuk dapat memberikan pertolongan pertama dalam menangani berbagai kondisi yang dapat membahayakan ibu dan bayi, dengan bertujuan dapat menurunkan angka kejadian asfiksia neonatorum berat.