

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa :

- Prevalensi kasus amebiasis yang terdapat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung pada periode tahun 2007–2010 adalah 149 kasus.
- Kelompok usia 0-10 tahun lebih sering terkena amebiasis intestinal, sedangkan pada usia > 40 tahun lebih sering terkena abses hepar amoeba.
- Amebiasis ditemukan lebih banyak pada pasien pria dibanding pasien wanita (pria : wanita ± 2,3 :1).
- Dari hasil pemeriksaan feses secara mikroskopik penderita amebiasis intestinal didapatkan kista positif, sedangkan pada penderita abses hepar amoeba didapatkan pemeriksaan serologis seramoeba positif.
- Keadaan pasien amebiasis di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung saat pulang banyak yang sudah mengalami perbaikan.

5.2 Saran

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit amebiasis, faktor resiko dari penyakit amebiasis melalui penyuluhan dan penerangan sehingga dapat mengurangi angka kejadian penyakit amebiasis, serta dapat mengetahui gejala dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat.
- Untuk bagian rekam medis rumah sakit lain agar data pasien dibuat lebih lengkap dan tepat sehingga data tersebut dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan.
- Untuk bagian laboratorium rumah sakit lain agar pemeriksaan yang dilakukan lebih lengkap dan spesifik, terutama jenis amoeba/bakteri/virus yang terdapat dibahan pemeriksaan pasien sehingga dapat mempermudah tenaga medis dan paramedik dalam menegakkan diagnosis.