

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian kasus *hemorrhoid* di Rumah Sakit Immanuel Bandung selama satu tahun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin insidensi *hemorrhoid* terbanyak pada laki-laki dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan yaitu 3:2.
2. Insidensi *hemorrhoid* terbanyak ditemukan pada kelompok usia 30-39 tahun yaitu sebanyak 26,7%, dan insidensi yang paling jarang ditemukan pada kelompok usia ≥ 70 tahun yaitu sebanyak 4,0%.
3. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai stadium penyakit *hemorrhoid*, didapatkan bahwa pasien terbanyak menderita *hemorrhoid* stadium 3 (57,3%) disusul dengan stadium 4 (27,3%) dan yang paling sedikit adalah stadium 1 yaitu 1,3%.
4. Sedangkan berdasarkan tipe histopatologis yang diperoleh, lokasi *hemorrhoid* terbanyak adalah *hemorrhoid* interna sebanyak 32 kasus atau sebesar 42,7% kemudian disusul oleh *mixed hemorrhoid* sebanyak 28 kasus (37,3%) dan yang paling jarang ditemukan adalah *hemorrhoid* eksterna yaitu 15 kasus (20%).

5.2. Saran

1. Penelitian ini baru mengungkapkan sedikit tentang penyakit *hemorrhoid*, untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga dapat lebih banyak diketahui mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *hemorrhoid*.
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut yang menekankan pada pengetahuan tentang penyakit *hemorrhoid*, pekerjaan pasien, jumlah anak serta kondisi kehamilan yang berhubungan dengan *hemorrhoid*.