

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui data rekam medik di RS Immanuel Bandung selama periode Januari 2008 sampai Desember 2010 maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Jumlah gigi impaksi lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan pada laki-laki.
2. Jumlah gigi impaksi terbanyak berkisar di rentang usia 22 sampai 25 tahun.
3. Gigi yang paling sering mengalami impaksi adalah gigi molar ketiga, terutama molar ketiga mandibula dibandingkan molar ketiga maksila.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, untuk meningkatkan perawatan gigi impaksi maka disarankan:

- Meningkatkan tindakan preventif guna mencegah timbulnya keadaan patologis yaitu segera melakukan ekstraksi pada gigi yang impaksi dan hindari penundaan ekstraksi.
- Melakukan penatalaksanaan yang tepat untuk kasus impaksi, dalam hal ini pemilihan waktu yang tepat untuk pencabutan gigi ekstraksi.

- Untuk rumah sakit atau instansi terkait lainnya disarankan untuk mengembangkan pelayanan gigi dan mulut terutama dalam bidang bedah mulut dan maksilofasial