

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pada penelitian mengenai insidensi dan karakteristik gagal ginjal kronis dengan stroke di Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Hasan Sadikin Bandung Periode Juni 2019 – Desember 2019 dapat disimpulkan bahwa.

- Terdapat 131 pasien gagal ginjal kronis dengan insidensi stroke 10%. Dari 13 orang pasien yang mengalami stroke ini, sebanyak 11 orang mengalami stroke iskemik dan 2 orang mengalami stroke hemoragik.
- Puncak kejadian stroke pada pasien gagal ginjal kronis terdapat pada kelompok usia 46-55 tahun, jenis kelamin wanita, indeks massa tubuh yang normal, hipertensi stage 2, tidak memiliki penyakit DM, pasien gagal ginjal kronis yang tidak merokok, pasien gagal ginjal kronis dengan hipertensi, dan stroke iskemik lebih sering terjadi pada gagal ginjal kronis dibandingkan dengan stroke hemoragik.

5.2 Saran

- Perlu dilakukan penelitian dalam jangka waktu yang lebih lama agar bisa didapatkan sampel lebih banyak.
- Perlu dilakukan penelitian mengenai karakteristik lain (anak-anak usia dibawah 18 tahun, ras, sosioekonomi, penyakit genetik, dan rokok elektrik) yang tidak dilakukan pada penelitian ini seperti gejala klinis awal pasien gagal ginjal kronis yang mengalami stroke.