



SURAT TUGAS
No.203/SUT/FKG-UKM/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM.
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha

Dengan ini menugaskan kepada :

Dr. Vinna Kurniawati Sugiawan, drg., M.Kes., PBO – NIK.120005

Melaksanakan publikasi jurnal dengan judul : *Efek Antifungi Sediaan Pasta Gigi Ekstrak Teh Hijau (Camellia sinensis L.) dan Peppermint (Menthapiperita) terhadap Candida albicans* di jurnal E-Gigi pada tahun 2024.

Demikian agar tugas ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bandung, 18 Maret 2024
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Kristen Maranatha

Dr. Ignatius Setiawan, drg., MM.
NIK. 120010

FAKULTAS
KEDOKTERAN GIGI

Volume 13 Nomor 1 2025

ISSN 2338-199X

Terakreditasi Nasional Berlaku sejak 2022 s/d 2027 dengan Surat Keputusan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nomor: 79/E/KPT/2023

e-GiGi

Jurnal Ilmiah Kedokteran Gigi



Diterbitkan oleh:
Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Komisariat Manado
bekerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado

eG

Volume 13

Nomor 1

Manado 2025

ISSN 2338-199X



Vol. 13 No. 1 (2025): e-GiGi



DOI: <https://doi.org/10.35790/eg.v13i1>

Published: 2024-02-02

Articles

Analisis Kandungan Mineral Air Tanah dan Gambaran Status Karies Gigi pada Masyarakat Desa Mala Kepulauan Talaud

Pascal G. Sagemba, Christy N. Mintjelungan, Billy J. Kepel

1-6



PDF

Efektivitas Ekstrak Daun Mangrove Bruguiera Gymnorrhiza Terhadap Bakteri Enterococcus Faecalis sebagai Alternatif Larutan Irigasi Perawatan Saluran Akar

Dinar A. Wicaksono, Pieter L. Suling, Jeremia Y. Mumu

7-14



PDF

Penggunaan Metode Game Interaktif untuk Edukasi Menggosok Gigi terhadap Kebersihan Gigi dan Mulut serta Kesehatan Gingiva pada Anak Tunanetra

Ignatius S. Jatmiko, Sri Kuswandari, Latifa G. S. Talida, Syahra H. Ningrum
15-21

 PDF

Pengaruh Tingkat Keparahan Karies terhadap Kebiasaan Mengunyah Satu Sisi pada Anak Usia 12-14 Tahun

Putri K. W. Mahendra, Veronica Wulandari, Shoimah A. Makmur
22-26

 PDF

Hubungan antara Kelemahan Fisik dengan Kelemahan Rongga Mulut pada Lansia

Steffano A. Handoko, Lindawati S. Kusdhany
27-36

 PDF

Efektivitas Waktu Perubahan Perilaku Lanjut Usia Pengguna Gigi Tiruan Lengkap dengan Menggunakan Video Pembersihan Gigi Tiruan Lengkap

(Kajian di Panti Jompo Pusaka 41 Yayasan Al-Madiniyah)

Niko Falatehan, Stefano D. Johannis
37-42

 PDF

Efek Antifungi Sediaan Pasta Gigi Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis* L.) dan Peppermint (*Menthapiperita*) terhadap *Candida albicans*

Vannia Wangguai, Vinna K. Sugiaman, Wahyu Widowati
43-50

 PDF

Pengaruh Edukasi Tentang Pemanfaatan Teledentistry terhadap Peningkatan Pengetahuan Pegawai Puskesmas

Lia H. Andayani, Mutiara A. Nusantara
51-57

 PDF

Pengaruh Berkumur Air Kelapa (*Cocos nucifera*) terhadap Laju Aliran Saliva

Vonny N. S. Wowor, Ni Wayan Mariati, Richard F. Depthios
58-63

 PDF

Pemanfaatan Youtube sebagai Sumber Pembelajaran untuk Mahasiswa

Ning T. Damayanti, Mita Juliawati

64-71

 PDF

Gambaran Sikap Guru SMA Negeri 1 Kakas terhadap Karies Gigi

Pritartha S. Anindita, Juliatri Juliatri, Jenever Rompas

72-77

 PDF

Efektivitas Minyak Kelapa Murni (Virgin Coconut Oil) terhadap Diskolorasi Gigi Akibat Teh Hitam

Dinar A. Wicaksono, Irene F. Rompas, Adinda Tarigan

78-82

 PDF

Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Bahaya Barodontalgia dengan Status Karies Gigi pada Instruktur Penyelam di Kota Manado

Christy N. Mintjelungan, Ni Wayan Mariati, Junistika P. Galongi

83-88

 PDF

Estimation of Time of Death through Observation of Microbiota Changes in the Oral Cavity

Fahriza R. Oktaviana, Ferry P. Gultom, Roben S. Pasaribu, Elza I. Auerkari

89-98

 PDF

Uji Aktivitas Anti-Inflamasi Ekstrak Sabut Kelapa (Cocos nucifera L.) dengan Metode Stabilisasi Membran Sel Darah Merah

Damajanty H. C. Pangemanan Pangemanan, Ni Wayan Mariati, Angelin L. Rantetondok

99-104

 PDF

Oral Clinical Findings in Cadaver with Tuberculosis: A Case Report

Anna Azizah, Nadilla I. Wahyu, Ayu Rahmadhani, Nurtami Soedarsono, Mindya Yuniastuti, Antonius W.

Suhartono, Mohammad A. Syarifudin, Anthon G. Fonataba

105-109

 PDF

Stainless Steel Crown pada Perawatan Pendahuluan Gigi Molar Pertama Permanen Muda: Keunggulan versus Kekurangan

Nanda T. Warizky, Jeffrey Jeffrey

110-115

 PDF

Pengaruh Ekstrak Buah Rimbang (*Solanum torvum Sw.*) Terhadap Pertumbuhan Bakteri *Enterococcus faecalis*

Putu R. K. Giri, IGA Fienna N. Sidiartha, Putri Rejeki, Elimia L. Putri

116-122

 PDF

Hubungan Perilaku Menyikat Gigi dan Kejadian Karies Gigi pada Anak Usia Sekolah di Desa Wori

Vonny N. S. Wowor, Janno B. B. Bernadus, Grace M. P. Lumbangaol

123-131

 PDF

Efektivitas Ekstrak Daging dan Biji Buah Kurma Ajwa (*Phoenix dactylifera L.*) terhadap Pertumbuhan Mikroorganisme dalam Rongga Mulut

Maqhfirah Amiruddin, Ibnu Rusyd

132-137

 PDF

Efektivitas Ekstrak Etanol Biji Anggur Merah (*Vitis vinifera*) terhadap Jumlah Fibroblas pada Perawatan Ortodonti

Hillda Herawati, Rhabiah El Fithriyah, Ahda A. Q. Ruswandi

138-144

 PDF

Hubungan Estetika Senyum dengan Persepsi Diri pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi

Yustisia Puspitasari, Eva Novawaty, Sarahfin Aslan, Nur F. Arifin, Andi Azisa D. Septiriani

145-150

 PDF

Efektivitas Anti Mikroba Air Ion Perak terhadap Derajat Keasaman (pH) Streptococcus mutans

Herautami C. Y. Setiawati, Dimas P. Wicaksono, Ardianti M. Dewi, Betadion Sinaredi

151-156



PDF

Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Daun Amaranthus hybridus L. dalam Pelarut Heksana, Etil Asetat, dan Air

Johni Halim, Monica D. Ranggaini, Sabrina N. Tedjokusumo

157-165



PDF

Hubungan Kehilangan Gigi dengan Status Gizi dan Kualitas Hidup pada Lansia di Kecamatan Balikpapan Timur

Gusti N. Ramadhana, Imran Irsal, Evi Fitriany

166-173



PDF

Ektopik Gigi 18 Simtomatik pada Sinus Maksilaris: Laporan Kasus

Didit Istadi, Feri Trihandoko

174-180



PDF

Gambaran Pola Sidik Bibir Masyarakat Desa Tateli Tiga

Johanna A. Khoman, Lydia E. N. Tendean, Joshua B. A. Kaunang

181-186



PDF

Hubungan Tingkat Pengetahuan Orang Tua dengan Status Karies Gigi Siswa Usia 10-12 Tahun di SDN Talawaan Bajo Kabupaten Minahasa Utara

Ni Wayan Mariati, Christy N. Mintjelungan, Marella T. Vania

187-194



PDF

Efek Anti Perdarahan Ekstrak Sabut Kelapa (Cocos Nucifera L) pada Luka Potong Ekor Mencit

Lydia E. N. Tendean, Johanna A. Khoman, Devani Ginotodihardjo

195-200



PDF

Pola Fraktur Kraniomaksilofasial Akibat Trauma Tumpul Terkait Identifikasi Forensik

Andi N. S. T. Meilana, Elza I. Auerkari

201-210



JOURNAL INFORMATION

Focus & Scope

Publication Frequency

Editorial Team

Board of Reviewer

Peer Review Process

Publication Ethics

Contact Us



TEMPLATE PENELITIAN

TEMPLATE CASE REPORT



Editorial Team

Editor in Chief

Dr, dr, Sunny Wangko, MSi, Perhimpunan Ahli Anatomi Indonesia Komisariat Manado, Indonesia

Managing Editor

dr Sonny John Ruddy Kalangi, MBiomed, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Editorial Board Members

Drg Juliatri Juliatri, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

dr. MKes, SpKKLP,AIFM, AIFO Damajanty H. C. Pangemanan, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

drg Michael Andreas Leman, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

drg Dinar A Wicaksono, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

drg. Krista Veronica Siagian, MKes, Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

dr, MSc, PhD Windy Mariane Virenia Wariki, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Board of Reviewers

OJS Oksfriani Jufri Sumampouw

Dr. dr. Jeini Ester Nelwan, Sam Ratulangi University, Indonesia

Roni Koneri, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Dr. rer. nat. Robert A Bara, Sam Ratulangi University, Indonesia

Prof Dr Ir Inneke Rumengan, Sam Ratulangi University, Indonesia

Nio Song Ai, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

Henny Lieke Rampe, Department of Biology, Sam Ratulangi University, Indonesia

prof, drg, PhD Endang Winiati, Universitas Indonesia, Indonesia

Drg Eri Hendra Jubhari, Universitas Hasanuddin, Indonesia

drg Tadeus Arufan Jasrin, Universitas Pajajaran, Indonesia

drg Acing Habibie Mude, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Drg, MMedEd, PhD Irfan Sugianto, Universitas Hasanuddin, Indonesia

Prof. drg Armasastra Bahar, PhD, Universitas Indonesia, Indonesia

drg Michael Andreas Leman, Universitas Sam Ratulangi, Indonesia

drg, Sp.Orto Pritartha S Anindita, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

drg. Krista Veronica Siagian, MKes, Program Studi Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

dr, SpPA-K Lily Lucia Loho, Pusat Diagnostik Patologi, Indonesia

JOURNAL INFORMATION

Focus & Scope

Publication Frequency

Editorial Team

Board of Reviewer

Peer Review Process

Publication Ethics

Contact Us



Efek Antifungi Sediaan Pasta Gigi Ekstrak Teh Hijau (*Camellia sinensis L.*) dan *Peppermint* (*Menthapiperita*) terhadap *Candida albicans* Antifungal Effect of Tooth Paste Containing Green Tea (*Camellia sinensis L.*) and *Peppermint* (*Menthapiperita*) on *Candida albicans*

Vannia Wangguai, Vinna K. Sugiama, Wahyu Widowati

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia
Email: vinnakurniawati@yahoo.co.id

Received: October 4, 2023; Accepted: March 7, 2024; Published online: March 16, 2024

Abstract: *Candida albicans* are normal flora of the oral cavity that are opportunistically pathogenic and becomes the main causative agent of oral candidiasis. The addition of herbal ingredients to toothpaste is a solution to resistance and synthetic antifungal side effects. Green tea and peppermint extracts are known to have an antifungal role with various active ingredients such as catechins, tannins, flavonoids, terpenoids, alkaloids, and saponins. This study aimed to determine the antifungal effect of toothpaste preparations of green tea extract and peppermint on *C. albicans*. This study used the agar diffusion method at several concentrations of green tea and peppermint extracts in toothpaste preparations, namely 1000 mg/ml, 500 mg/ml, 250 mg/ml, 125 mg/ml, 62,5 mg/ml and 31,25 mg/ml. The results showed that there was an antifungal effect of green tea and peppermint extract toothpaste against *C. albicans* at a concentration of 1000 mg/ml with an average inhibition zone diameter of 7.19 mm. The smallest inhibition zone was 125 mg/ml with a diameter of 1.16 mm. In conclusion, green tea and peppermint extract toothpastes have antifungal effects. The higher the concentration of the extract used in the toothpaste preparation, the greater the antifungal inhibition zone formed.

Keywords: *Candida albicans*; antifungal toothpaste; green tea; peppermint

Abstrak: *Candida albicans* merupakan flora normal rongga mulut yang bersifat patogen oportunistik dan menjadi agen penyebab utama kandidiasis oral. Penambahan bahan herbal pada pasta gigi mikroba merupakan solusi terhadap resistensi dan efek samping antijamur sintetik. Ekstrak teh hijau dan *peppermint* diketahui memiliki peran sebagai antijamur dengan berbagai kandungan aktifnya seperti katekin, tanin, flavonoid, terpenoid, alkaloid dan saponin. Mengetahui efek antifungi sediaan pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *C. albicans*. Penelitian ini menggunakan metode difusi agar dengan beberapa konsentrasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* dalam sediaan pasta gigi yaitu 1000 mg/ml, 500 mg/ml, 250 mg/ml, 125 mg/ml, 62,5 mg/ml dan 31,25 mg/ml. Hasil penelitian memperlihatkan adanya efek antifungi pada pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *C. albicans* pada konsentrasi 1000 mg/ml dengan diameter zona hambat rata-rata sebesar 7,19 mm. Zona hambat terkecil dari konsentrasi 125 mg/ml dengan diameter 1,16 mm. Simpulan penelitian ini ialah pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* memiliki efek antijamur. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam sediaan pasta gigi maka semakin besar zona hambat antijamur yang terbentuk.

Kata kunci: *Candida albicans*; pasta gigi antifungi; teh hijau; *peppermint*

PENDAHULUAN

Candida sp. merupakan patogen oportunistik yang menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, sehingga menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. *Candida sp.* merupakan mikroorganisme eukariotik berbentuk oval memiliki hifa atau pseudohifa dan menjadi flora normal terutama pada saluran cerna, membran mukosa saluran pernapasan, vagina, uretra, serta kulit.¹ Spesies *Candida* yang terdapat di kavitas oral yang sering ditemukan di antaranya ialah *Candida albicans*, *Candida tropicalis*, *Candida krusei*, *Candida parapsilosis*, dan *Candida guilliermondii*. *C. albicans* merupakan flora normal rongga mulut yang paling sering menyebabkan infeksi, sebagai contoh *acute pseudomembranous candidiasis*, *acute atrophic candidiasis*, *chronic atrophic candidiasis*, *chronic hyperplastic candidiasis*, dan *candida cheilosis*. Selain itu, *C. albicans* ialah fungi penyebab kandidiasis dengan insiden tertinggi yaitu sekitar 85-95%.^{2,3} Organisme ini juga menyebabkan sejumlah infeksi seperti *mucosal candidiasis* hingga *life-threatening disseminated candidiasis*.⁴

Pencegahan masalah kesehatan mulut dapat dilakukan dengan cara melakukan tindakan preventif menyikat gigi dan pemeriksaan kesehatan mulut secara teratur. Frekuensi menyikat gigi yang disarankan ialah dua kali sehari dengan penggunaan pasta gigi. Saat ini lebih banyak pasta gigi yang memiliki kemampuan antibakteri dibandingkan pasta gigi yang memiliki kemampuan antifungal. Pasta gigi yang dijual di pasaran sebagian besar mengandung bahan seperti agen abrasif, humektan, agen pengental, pewarna, perasa, dan agen antibakteri yang dapat mencegah pembentukan plak dan kolonisasi bakteri.⁵ Oleh karena itu, telah banyak inovasi dengan menambahkan komponen herbal yang memiliki aktivitas anti-inflamasi, astringen, dan antimikroba.^{6,7} Pemanfaatan herbal atau bahan alam sebagai obat dan alternatif bahan kimia telah berkembang selama tiga dekade terakhir karena memiliki efek terapeutik yang potensial, seperti antibakteri, dan antifungi. Bahan herbal ini banyak terdapat di sekitar kita dan bisa didapatkan dari berbagai macam tumbuhan.^{8,9}

Kandungan ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis* L.) dan *peppermint* (*Menthapiperita*) dalam pasta gigi merupakan salah satu jenis herbal yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba, termasuk *Candida*.¹⁰ Daun teh hijau mengandung senyawa flavonoid yang berfungsi untuk menghambat proliferasi sel-sel *Candida*. Senyawa ini dapat mengganggu integritas membran dan dinding sel serta dapat mengganggu metabolisme sel dengan cara menghambat transpor sel.¹¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan Madhura et al¹² menyatakan terdapat perbedaan zona hambat yang bermakna pada koloni *Candida sp* yang diberi ekstrak teh hijau dibandingkan kelompok kontrol. Peningkatan konsentrasi teh hijau diikuti dengan peningkatan luas zona hambat. Selain itu, daun teh hijau juga mengandung senyawa alkaloid dan terpenoid. Alkaloid berfungsi sebagai antijamur dengan mencegah replikasi DNA *Candida*, sedangkan terpenoid menghambat *Candida* dengan cara menurunkan permeabilitas membran sel mikroorganisme.¹³

Peppermint juga dapat digunakan sebagai antifungi karena mengandung senyawa flavonoid, asam fenolat, mentol, saponin, dan tanin.¹⁴ Saponin sebagai antifungi bekerja dengan cara mengganggu stabilitas membran sel; tanin bekerja dengan cara menghambat sintesis kitin pada *Candida*; dan mentol menghambat pembentukan biofilm *C. albicans* dengan cara menginduksi permeabilitas membran plasma.^{11,14,15} Uji *disc diffusion* yang dilakukan Audreylia et al⁹ untuk mengetahui zona hambat fungi menunjukkan bahwa *paper disc* yang direndam dalam minyak *peppermint* menunjukkan rerata luas zona hambat sebesar 31,67 mm pada koloni *C. albicans* ATCC 10231.

Oleh karena ekstrak teh hijau dan *peppermint* memiliki efek antifungi yang dapat membantu menghambat pertumbuhan *C. albicans* pada lingkungan rongga mulut, maka peneliti tertarik mengetahui efek antifungi dari kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *C. albicans* yang diformulasikan dalam bentuk pasta gigi. Penggunaan kombinasi dua ekstrak tanaman herbal seperti teh hijau dan *peppermint* akan memberikan efek sinergis sehingga akan memiliki efek antifungi lebih baik dan berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan gigi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan *post-test only control group design*. Efek antifungi sediaan pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *C. albicans* dinilai dengan menggunakan metode difusi agar. Subjek penelitian ialah biakan *C. albicans* yang didapatkan dari laboratorium Aretha Medika Utama Bandung. Sampel penelitian yang digunakan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu kelompok formula pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* dengan konsentrasi masing-masing ekstrak 2% (kelompok 1), kelompok *base* yaitu formula pasta gigi tanpa kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* (kelompok 2), kelompok kontrol positif (kelompok 3), dan kelompok kontrol negatif (kelompok 4). Jumlah sampel ialah 24 dengan pengulangan untuk masing-masing kelompok perlakuan sebanyak 3 kali pengulangan.

Media tumbuh yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Mueller Hinton Agar* (MHA) dan *Mueller Hinton Broth* (MHB). Sebanyak 19 gr media MHA dan 10.5 media MHB ditimbang dengan menggunakan *analytical balance*. Keduanya kemudian dilarutkan masing-masing dalam 500 mL ddH₂O dengan bantuan *microwave*. Setelah itu dilakukan sterilisasi dengan menggunakan *autoclave* pada suhu 121°C dengan tekanan 1,5 atm selama 20 menit.

Senyawa antimikroba yang akan diuji pada penelitian ini adalah pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* dengan konsentrasi sebesar 1000 mg/ml; 500 mg/ml; 250 mg/ml; 125 mg/ml; 62,5 mg/ml; 31,25 mg/ml; dan Pasta Gigi Base 1000 mg/ml yang diencerkan dengan menggunakan NaCl 0,9%, pasta gigi Pepsodent sebagai kontrol positif, dan NaCl 0,9% sebagai kontrol negatif.

Pembuatan formulasi sediaan pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* dilakukan dengan pembuatan basis pasta terlebih dahulu di PT SkinSol, Bandung, Jawa Barat dengan formula standar yang terdiri dari komposisi kalsium karbonat 57 gr, natrium lauril sulfat 1 gr, gliserin 21 gr, tragakan 1,5 gram, natrium sakarin 1 tetes, natrium benzoat 1 mikrospatula. Selanjutnya dilakukan pembuatan campuran pasta gigi dari ekstrak teh hijau dan *peppermint* dilakukan dengan metode maserasi dengan basis pasta yang telah dibuat dengan bahan dasar teh hijau dan *peppermint* dengan perbandingan 1:10 untuk teh hijau dan *peppermint* 1:10 dengan tambahan 22 liter air setiap perbandingannya atau dengan presentase 1% ekstrak teh hijau dan 1% ekstrak *peppermint*, kemudian tambahkan basis pasta dengan bahan natrium karboksimetil selulosa (Na-CMC) yang dikembangkan dalam 30 ml akuades selama 24 jam. Setelah Na-CMC selesai dikembangkan kemudian masukan gliserin ke dalam wadah. Aduk menggunakan *mixer* selama 10 menit serta ditambahkan larutan etanol 1 ml, lalu ditambahkan larutan metil paraben kemudian diaduk menggunakan *mixer* selama 5 menit hingga menjadi homogen.

Pada pembuatan seri konsentrasi, larutan stok pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau (ETH) dan *peppermint* (Pp) yang digunakan dibuat dengan melarutkan 2000 mg pasta gigi kombinasi ETH dan Pp dalam 1 mL NaCl 0,9% sehingga larutan stok memiliki konsentrasi sebesar 2000 mg/ml ekstrak dalam NaCl 0,9%. Pengenceran stok pasta gigi kombinasi ETH dan Pp dilakukan dengan menggunakan NaCl 0,9% untuk membuat seri konsentrasi. Seri konsentrasi ekstrak yang digunakan ialah sebagai berikut: Pasta Gigi ETH_Pp 2000 mg: 1000 µL stok; Pasta Gigi ETH_Pp 1000 mg/ml: 500 µL larutan stok + 500 µL NaCl 0,9%; Pasta Gigi ETH_Pp 500 mg/ml: 500 µL larutan A + 500 µL NaCl 0,9%; Pasta Gigi ETH_Pp 250 mg/ml: 500 µL larutan B + 500 µL NaCl 0,9%; Pasta Gigi ETH_Pp 125 mg/ml: 500 µL larutan C + 500 µL NaCl 0,9%; pasta Gigi ETH_Pp 62.5 mg/ml: 500 µL larutan D + 500 µL NaCl 0,9%; pasta gigi ETH_Pp 31.25 mg/ml: 500 µL larutan E + 500 µL NaCl 0,9%.

Pada pembuatan inokulum jamur dilakukan dengan metode *direct colony suspension*. Inokulum didapatkan dengan menginokulasikan koloni *Candida albicans* yang telah dikultur selama 18-24 jam pada medium MHA, ke dalam medium MHB. Kekeruhan dari larutan tersebut kemudian disesuaikan dengan kekeruhan larutan standar McFarland 0,5 untuk mendapatkan inokulum dengan jumlah bakteri sekitar 1- 2×10⁸ CFU/mL.

Pada *disk diffusion test*, proses inokulasi pada lempeng agar dilakukan dengan


menggunakan metode *swab*. *Cotton swab* steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri yang kekeruhannya telah disesuaikan sebelumnya dengan larutan standar McFarland 0.5. *Cotton swab* tersebut ditekan ke dinding tabung untuk menghilangkan suspensi berlebih, kemudian diusapkan ke permukaan MHA secara merata dan dibiarkan pada suhu ruang selama 3 sampai 5 menit hingga suspensi tersebut terserap ke dalam agar. Setelah itu, cakram kertas berukuran 6 mm direndam dalam 1 ml setiap konsentrasi pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint*, pasta gigi tanpa kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint*, pasta gigi kontrol positif (pasta gigi herbal merk tertentu), dan NaCl 0,9% selama kurang lebih 5 menit hingga larutan meresap ke dalam cakram. Kertas cakram diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi. Pada penelitian ini dilakukan uji sebanyak 3 kali pengulangan. Lempeng agar tersebut diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam, kemudian dilakukan pengukuran diameter zona hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong. Pengukuran diameter zona hambat dilakukan sesuai dengan panduan CLSI dengan klasifikasi *susceptible* ($\geq 20\text{mm}$), *intermediate* (15-19mm), resisten ($\leq 14\text{mm}$).

HASIL PENELITIAN


Tabel 1 dan Gambar 1 memperlihatkan hasil uji aktivitas antifungi dari pasta gigi ekstrak teh hijau (*Camellia sinensis L.*) dan *peppermint* (*Menthapiperita*) terhadap *Candida albicans* dengan rerata (*mean*) dan simpangan baku (standar deviasi). Yang paling mendekati kelompok kontrol positif ialah pasta gigi dengan ekstrak teh hijau dan *peppermint* 1000 mg/ml sedangkan kelompok ETH 62,5 mg/ml dan ETH 31,25 mg/ml tidak efektif sebagai antifungi.

Tabel 1. Rerata diameter zona hambat ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *Candida albicans*

Kelompok	Diameter Zona Hambat		Efektivitas
	Mean	Stdev	
Kontrol positif	10,16	0,11	Resisten
Kontrol negatif	0,00	0,00	Tidak terdeteksi
ETH 1000 mg/ml	7,19	0,04	Resisten
ETH 500 mg/ml	6,05	0,03	Resisten
ETH 250 mg/ml	4,04	0,15	Resisten
ETH 125 mg/ml	1,16	0,04	Resisten
ETH 62,5 mg/ml	0,00	0,00	Tidak terdeteksi
ETH 31,25 mg/ml	0,00	0,00	Tidak terdeteksi
Pasta Gigi Base	0,00	0,00	Tidak terdeteksi



Gambar 1. Rerata diameter zona hambat ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *Candida albicans*



Gambar 2. Hasil pengamatan zona hambat pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *Candida albicans*

Keterangan:

1. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 1000 mg/ml
2. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 500 mg/ml
3. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 250 mg/ml
4. Pasta gigi tanpa kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint (base)
5. Pasta gigi merk tertentu (kontrol positif)
6. NaCl 0,9% (kontrol negatif)
7. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 125 mg/ml
8. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 62,5 mg/ml
9. Pasta gigi kombinasi ekstrak teh hijau dan peppermint 31,25 mg/ml

Hasil uji normalitas memperlihatkan seluruh kelompok perlakuan memiliki nilai $p > 0,05$ dan dinyatakan berdistribusi normal. Karena seluruh kelompok terdistribusi normal, maka uji perbandingan yang digunakan ialah uji *One Way ANOVA* untuk mengetahui perbedaan efek antifungi dari pasta gigi dengan ekstrak teh hijau dan *peppermint* terhadap *C. albicans*. Hasil uji *One-Way ANOVA* mendapatkan nilai $p < 0,05$ yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi daya hambat terhadap pertumbuhan *C. albicans*.

BAHASAN

Diameter zona hambatan bertambah setiap kenaikan konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint*, semakin besar efek antijamur yang dimiliki. Pada kelompok pembanding yaitu formula pasta gigi tanpa menggunakan ekstrak teh hijau dan *peppermint* (kelompok 2) didapatkan rata-rata zona hambat 0,00 mm. Hal ini terjadi karena pasta gigi yang digunakan tidak mengandung zat antijamur. Pasta gigi tersebut hanya mengandung *fluoride*, hidroksiapatit, kalsium karbonat, *xylitol*, dan zat pengikat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, dimana pasta gigi plasebo digunakan sebagai kelompok kontrol dalam penelitian pengaruh pasta gigi ekstrak lengkuas merah terhadap *C. albicans*. Pada penelitian tersebut, diketahui tidak tampak adanya diameter zona hambat pasta gigi plasebo karena pasta gigi tersebut hanya mengandung bahan dasar pasta gigi dan tidak mengandung antijamur.

Terbentuknya daerah daya hambat disekitar cakram menunjukkan terdapat adanya hambatan pertumbuhan koloni jamur akibat bahan aktif ekstrak teh hijau dan *peppermint* yang

menyebabkan kerusakan sel jamur. Secara umum, mekanisme kerja bahan yang bersifat antifungi dalam menghambat pertumbuhan jamur terdiri atas beberapa cara, yaitu menghambat sintesis dinding sel jamur, menonaktifkan enzim metabolik, menghambat sintesa asam nukleat dan protein serta mengganggu membran sel jamur.¹⁶ Evensen dan Phyllis¹⁷ meneliti efek polifenol teh terhadap hambatan pembentukan biofilm *C. albicans* didapatkan bahwa polifenol yang terkandung dalam teh hijau memiliki aktivitas antifungi terhadap *C. albicans*. Aktivitas antifungi yang dimaksud adalah menyebabkan tidak stabilnya metabolik kultur *C. albicans*. Katekin dalam teh hijau yang terdiri dari epigalokatekin gallat (EGCG), epigalokatekin (EGC) dan epikatekin gallat (ECG) terbukti menghambat pertumbuhan *C. albicans* dengan mencegah pembentukan biofilm. *C. albicans* yang telah membentuk biofilm dapat mencegah penetrasi dan kinerja agen antijamur sehingga seringkali didapatkan resistensi terhadap obat-obatan antijamur dibandingkan pada sel planktonik.¹⁷ Namun polifenol yang terkandung didalam teh hijau dapat menembus struktur sel luar dan memasuki *C. albicans* serta mengganggu aktivitas intraseluler sel. Selain itu, pada konsentrasi polifenol yang lebih tinggi, tidak hanya dapat menghambat pembentukan biofilm namun juga dapat mengganggu aktivitas proteosomal yang mengatur metabolisme sel.¹⁸

Selain katekin, teh hijau mengandung metabolit sekunder yang dapat mengganggu aktivitas *C. albicans* seperti tanin, flavonoid, terpenoid dan alkaloid.¹⁹ Mekanisme flavonoid sebagai antijamur yaitu berikatan dengan enzim ekstraseluler dan protein terlarut serta merusak membran sel jamur. Membran sel jamur merupakan tempat terjadinya beberapa reaksi enzim sel, sehingga ketika mengalami kerusakan maka mempengaruhi pertumbuhan jamur. Alkaloid berperan dengan menyisip diantara dinding sel dan DNA kemudian mencegah replikasi DNA jamur.¹⁹ Terpenoid yang terkandung di dalam teh hijau dapat berperan sebagai pelarut yang dapat membawa masuk metabolik sekunder ke dalam membran, sehingga menyebabkan gangguan permeabilitas sel. Tanin berperan dengan mengikat membran ergosterol sehingga menghambat biosintesis ergosterol dan terjadi kehilangan komponen interseluler. Selain itu, tanin juga mengganggu reproduksi vegetatif.²⁰ Teh hijau juga mengandung asam lemak yang dapat menghambat morfogenesis jamur serta pembentukan hifa dengan mekanisme kerja yang hampir sama dengan terpenoid.¹⁹ Kerusakan hifa mengakibatkan sel jamur menjadi peka dan rentan terhadap perubahan lingkungan sehingga lebih mudah mati.²¹

Konsentrasi rendah dari minyak esensial *peppermint* dapat menghambat respirasi sel jamur dan pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan permeabilitas luar dan dalam membran mitokondria. Kandungan dalam *peppermint* dapat menghambat sintesis ergosterol. Ergosterol merupakan salah satu komponen penting dalam sel jamur dan hambatan sintesis zat ini dapat mengarah pada kerusakan membran dan struktur dinding sel jamur.²²

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai efek antijamur *peppermint* terhadap *Candida albicans* dan *Candida krusei*, diperoleh hasil bahwa minyak esensial dari *peppermint* mampu melakukan aktivitas antikandidal yang mengakibatkan “kematian” sel dengan menurunkan jumlah ergosterol dan menghasilkan pengasaman intraseluler setelah penghambatan PM-ATPase.²³ Pengaruh minyak esensial terhadap penghambatan *germ tube* dapat terjadi akibat stress oksidatif yang mempengaruhi aktivitas enzimatik dan mempengaruhi potensi mitokondria membran sel sehingga mengarah pada terhambatnya pertumbuhan sel hingga kematian sel.²⁴ Aktivitas antijamur dari minyak esensial *peppermint* disebabkan oleh efek sitotoksik yang mengakibatkan kerusakan dan perubahan permeabilitas membran.²¹ Mentol sebagai komponen utama *peppermint* mengakibatkan perubahan permeabilitas membran sel dengan masuk diantara asam lemak sel jamur karena sifat lipofiliknya. Perubahan permeabilitas membran sel dapat membuat lisisnya sel dan mengarah pada kematian sel.²⁵ Minyak esensial *peppermint* diketahui dapat menghambat kerja PM-ATPase yang berperan dalam mengatur pH intrasel, pertumbuhan sel serta patogenesitas jamur. Terhambatnya PM-ATPase menyebabkan pH intraseluler menjadi asam dan menyebabkan kematian sel.²⁶

Aktivitas antijamur ekstrak etanol dan etil asetat dari *peppermint* terhadap *C. albicans*,

diperoleh bahwa ekstrak etanol dan etil asetat dari daun *peppermint* mengandung alkaloid dan saponin yang memiliki efek antijamur.²⁷ Alkaloid diketahui perannya dengan menghambat polimerase DNA serta respirasi sel. Saponin merupakan senyawa metabolit sekunder *peppermint* yang dapat menyebabkan lisisnya sel jamur dengan memperkecil tegangan permukaan membran sterol sehingga terjadi kebocoran cairan intraseluler melalui membran sel jamur.¹⁶ Selain itu, senyawa metabolit sekunder *peppermint* yang juga memiliki efek antijamur adalah tanin. Tanin memiliki kemampuan untuk menghambat sintesis kitin yang digunakan dalam pembentukan dinding sel jamur sehingga pertumbuhan jamur dapat terhambat.²⁸

SIMPULAN

Sediaan pasta gigi ekstrak teh hijau dan *peppermint* dengan variasi konsentrasi 1000 mg/ml, 500 mg/ml, 250 mg/ml, dan 125 mg/ml memiliki efek antijamur terhadap *C. albicans*. Diameter zona hambat tertinggi dan paling mendekati zona hambat kelompok kontrol positif ditemukan pada konsentrasi ekstrak tertinggi yaitu 1000 mg/ml. Semakin besar konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam sediaan pasta gigi, semakin besar diameter zona hambatnya.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Khatimah K, Mone I, Fa'al SN. Identifikasi *Candida* Sp pada kuku jari tangan dan kuku kaki petani Dusun Panaikang Desa Bontolohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *J Media Laboran*. 2018;8(1):39-43. Available from: <https://jurnal.uit.ac.id/MedLAB/article/download/387/261>
2. Hakima AN, Ermawati T, Harmono H. Daya hambat ekstrak biji kopi robusta (*Coffea canephora*) terhadap pertumbuhan *Fusobacterium nucleatum*. *Stomatognatic*. 2020;17(1):20-4. Doi: <https://doi.org/10.19184/stoma.v17i1.23608>
3. Kurniawan AA, Wardana T, Darmawan AR. Laporan kasus: kandidiasis akut eritematous pada penderita diabetes melitus. *Stomatognatic*. 2018;15(1):21-25. Doi: <https://doi.org/10.19184/stoma.v15i1.17909>
4. Makhfirah N, Fatimatu Zahra C, Mardina V, Hakim RF. Pemanfaatan Bahan Alami Sebagai Upaya Penghambat *Candida albicans* Pada Rongga Mulut. *Jurnal Jeumpa*. 2020;7(2):400-413. Doi: <https://doi.org/10.33059/jj.v7i2.3005>
5. Kumar MS, Bhaskar UA, Sowmya B. Assesment of antifungal activity of six popular toothpaste against clinical isolates of *Candida aalbicans*. *International Journal of Applied Dental Sciences*. 2015;1(5):1-4.
6. Al-qahtani SM, Razak PA, Khan SDAA. Knowledge and practice of preventive measures for oral health care among male intermediate schoolchildren in Abha, Saudi Arabia. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(3):703. Doi: [10.3390/ijerph17030703](https://doi.org/10.3390/ijerph17030703)
7. Shirakawa S. Effects of natural herb-containing dental toothpaste on periodontal pathogenic bacteria and clinical parameters: a randomized clinical trial. *J Herb Med*. 2021;30(1):56-60. Doi: [10.1016/j.hermed.2021.100517](https://doi.org/10.1016/j.hermed.2021.100517)
8. Singla MG. Abrasive action of different herbal toothpastes : a profilometric analysis. *Journal of Dental Research and Review*. 2021;8(4):312-6. Doi: [10.4103/jdr.jdr_96_21](https://doi.org/10.4103/jdr.jdr_96_21)
9. Audreylia E, Buddiman Y, Surja SS. Menthapiperita extract, a potential antifungal agent againts *Candida albicans* dan *Candida krusei*. *Current Research in Environmental & Applied Mycology (Journal of Fungal Biology)*. 2020;10(1):236-41, Doi [10.5943/cream/10/1/23](https://doi.org/10.5943/cream/10/1/23)
10. Putra FS, Mintjelungan CN, Juliatri. Efektivitas pasta gigi herbal dan non- herbal terhadap penurunan plak gigi anak usia 12-14 tahun. *e-GiGi*. 2017;5(2):152-7. Doi: <https://doi.org/10.35790/eg.5.2.2017.17022>
11. Yassir M, Asnah. Pemanfaatan jenis tumbuhan obat tradisional di Desa Batu Hamparan Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Biotik*. 2018;6(1):17-34. Doi: <http://dx.doi.org/10.22373/biotik.v6i1.4039>
12. Madhura M, Shweta RD, Kumar BV, Savithri D. Antifungal effect of green tea extracts on oral *Candida* species: an in vitro study. *Journal of Advanced Clinical and Research Insight*. 2016;3(1):1-4. Doi: <https://doi.org/10.3390/jacr3010001>

- 10.15713/ins.jcri.93
13. Komala O. Aktivitas antifungi ekstrak etanol 50% dan etanol 96% daun pacar kuku *Lawsonia inermis* L terhadap *Trichophyton mentagrophytes*. *J Ilmu Ilmu Dasar dan Lingkung Hidup*. 2019;19(1):12–9. Doi: 10.33751/ekol.v19i1.1657
 14. Enderini LH. Analisis rendemen dan penetapan kandungan ekstrak etanol 96% daun teh hijau (*Camellia Sinensis* L.) dengan metode kromatografi lapis tipis. SEMNASKes - 2019 “Improving The Quality of Health Through Advances in Research of Health Sciences” ISBN:978-602-5793-65-3. p. 30–40.
 15. Norouzi N, Alizadeh F, Khodavandi A, Jahangiri M. Antifungal activity of menthol alone and in combination on growth inhibition and biofilm formation of *Candida albicans*. *Journal of Herbal Medicine*. 2021;29:100495. Doi: 10.1016/j.hermed.2021.100495
 16. Pinto E, Hrimpeng K, Lopes G, Vaz S. Antifungal activity of *Ferulago capillaris* essential oil against *Candida*, *Cryptococcus*, *Aspergillus* and dermatophyte species. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2013;32(10):1311-20. Doi: 10.1007/s10096-013-1881-1
 17. Evensen NA, Phyllis CB. The effects of tea polyphenols on *Candida albicans*: inhibition of biofilm formation and proteasome inactivation. *Can J Microbiol*. 2009;55(9):1033-9. Doi: 10.1139/w09-058
 18. Sabila A, Ismail A, Mujayanto R. Oral hygiene buruk pasien rawat inap tidak berkaitan dengan pertumbuhan oral candidiasis. *Odonto Dental Journal*. 2017;4(1):56-60. Available from: <https://doi.org/10.30659/odj.4.1.56-60>
 19. Lestari PI. Aktivitas antifungi ekstrak daun teh terhadap pertumbuhan *Aspergillus flavus*. *The Indonesian Journal of Infectious Disease*. 2017;1(01):27. DOI:10.32667/ijid.v1i01.5
 20. Mollashahi NF, Bokaeian M, Mollashahi LF, Afrougheh A. Antifungal efficacy of green tea extract against *Candida Albicans* biofilm on tooth substrate. *J Dent (Tehran)*. 2015;12(8):592-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27123019/>
 21. Fameilia A, Kristiana D, Parnaadji R. The influence comparison of steeping green tea dregs (*Camelia sinensis* (L.) Kuntze) and steeping rosella tea dregs (*Hibiscus sabdariffa* Linn) as denture cleaner towards *Candida albicans* growth. *Jurnal Kesehatan Gigi*. 2022;9(1):1-8. Doi:10.31983/jkg.v9i1.8329
 22. Ellepola ANB, Khan ZU, Chandy R, Philip L. A comparison of the antifungal activity of herbal toothpastes against other brands of toothpastes on clinical isolates of *Candida albicans* and *Candida dubliniensis*. *Med Princ Pract*. 2011;20(2):112-7. Doi: 10.1159/000321199
 23. Tullio V, Roana J, Scalas D, Mandras N. Evaluation of the antifungal activity of *Mentha x piperita* (Lamiaceae) of Pancalieri (Turin, Italy) essential oil and its synergistic interaction with azoles. *Molecules*. 2019;24(17):3148. Doi: 10.3390/molecules24173148.
 24. Rajkowska K, Otlewska A, Styczynska AK, Krajewska A. *Candida albicans* impairment induced by peppermint and clove oils at sub-inhibitory concentration. *Int J Mol Sci*. 2017;18(6):1307. Doi: 10.3390/ijms18061307
 25. Mutiawati VK. Pemeriksaan mikrobiologi pada *Candida albicans*. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*. 2016;16(1):53-62. Available from: <https://www.e-jurnal.com/2016/11/pemeriksaan-mikrobiologi-pada-candida.html>
 26. Pinto E, Hrimpeng K, Lopes G, Vaz S, Gonçalves MJ, Cavaleiro C, et al. Antifungal activity of *Ferulago capillaris* essential oil against *Candida*, *Cryptococcus*, *Aspergillus* and dermatophyte species. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 2013;32(10):1311-20. Doi: 10.1007/s10096-013-1881-1.
 27. Berakdar N, Radwan A. Antifungal activity of peppermint oil against *Candida albicans* isolated from urine samples. *International Journal of Pharmaceutical Sciences and nanotechnology*. 2019;12(4):1-5. Doi:10.37285/ijpsn.2019.12.4.7
 28. Alfiah RR, Siti K, Masnur T. Efektivitas ekstrak metanol daun sembung rambat (*Mikania micrantha Kunth*) terhadap pertumbuhan jamur *Candida albicans*. *Protobiont*. 2015;4(1):52-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.26418/protobiont.v4i1.8735>