

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Sepsis dapat menimbulkan ARDS karena sel endotel merupakan sebuah sumber dan target inflamasi pada sepsis.

4.2 Saran

1. Hendaknya kalangan medis dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai sepsis dengan mengikuti perkembangan patofisiologi dan teknik pengobatannya, mengingat patofisiologi sepsis yang selalu mengalami perubahan.
2. Karena infeksi nosokomial merupakan penyebab utama sepsis maka sebaiknya penggunaan instrumen invasif pada pasien dikurangi baik frekuensi maupun durasinya, monitoring dan penggantian instrumen harus benar-benar diperhatikan, mengingat sepsis hanya akan memperburuk keadaan pasien.
3. Mengingat masih terdapat banyaknya kegagalan terapi sepsis dengan menggunakan sediaan yang dapat memodifikasi respon inflamasi, maka penelitian lebih lanjut mengenai cara kerja sediaan, dosis dan waktu pemberian yang tepat sangatlah dibutuhkan, karena berbagai sediaan bekerja sangat spesifik hanya pada mediator tertentu, dosis yang masih bervariasi dan sempitnya masa jendela yang dimiliki oleh sebagian mediator.